



*Barbus plebejus*

(Bonaparte 1839)

FAMIGLIA: *Cyprinidae*

ORDINE: *Cypriniformes*

## MORFOLOGIA

corpo affusolato ed allungato; la bocca carnosa è rivolta verso il basso con quattro barbigli ai lati; colorazione verdastria sul dorso più o meno punteggiata di nero (soprattutto nei giovani), giallo dorata sui fianchi e biancastra sul ventre

## TAGLIA

mediamente sui 30 cm; eccezionalmente supera i 50-60 cm e i 4 kg di peso

## DISTRIBUZIONE

nelle acque dolci di tutto il territorio italiano, escluse le isole. In Umbria è ampiamente diffuso soprattutto nelle acque correnti

## HABITAT

acque correnti limpide, fondo ghiaioso o sassoso (tratto pedemontano, ZONA A BARBO). Raro nei laghi

## COMPORTEMENTO

specie gregaria nella fase giovanile; adulto solitario

## ALIMENTAZIONE

invertebrati di fondo (anellidi, larve d'insetti, molluschi); occasionalmente detrito di fondo, materiale vegetale e piccoli pesci

## RIPRODUZIONE

si protrae da aprile a giugno. L'accrescimento è lento; nelle femmine la maturità sessuale è raggiunta a 4-5 anni d'età

## FAMIGLIE e Specie

### SALMONIDAE

- [Trota fario](#)
- [Trota iridea](#)
- [Coregone](#)

### CYPRINIDAE

- [Cavedano](#)
- [Barbo comune](#)
- [Lasca](#)
- [Alborella](#)
- [Carassio](#)
- [Carassio dorato](#)
- [Carpa erbivora](#)
- [Carpa](#)
- [Carpa a specchi](#)
- [Triotto](#)
- [Savetta](#)
- [Scardola](#)
- [Rovella](#)
- [Vairone](#)
- [Tinca](#)

### COTTIDAE

- [Scazzone](#)

### GOBIDI

- [Ghiozzo di ruscello](#)

### COBITIDAE

- [Cobite](#)

### ICTALURIDAE

- [Pesce gatto](#)

### SILURIDAE

- [Siluro](#)

### POECILIDAE

- [Gambusia](#)

### ESOCIDAE

- [Luccio](#)

### ATHERINIDAE

- [Latterino](#)

CENTRARCHIDAE

- [Persico sole](#)
- [Persico trota](#)

PERCIDAE

- [Persico reale](#)
- [Lucioperca](#)

MUGILIDAE

- [Cefalo](#)

ANGUILLIDE

- [Anguilla](#)