



Leuciscus cephalus

(Linnaeus 1758)

FAMIGLIA: *Cyprinidae*

ORDINE: *Cypriniformes*

FAMIGLIE e Specie

SALMONIDAE

- [Trota fario](#)
- [Trota iridea](#)
- [Coregone](#)

CYPRINIDAE

- [Cavedano](#)
- [Barbo comune](#)
- [Lasca](#)
- [Alborella](#)
- [Carassio](#)
- [Carassio dorato](#)
- [Carpa erbivora](#)
- [Carpa](#)
- [Carpa a specchi](#)
- [Triotto](#)
- [Savetta](#)
- [Scardola](#)
- [Rovella](#)
- [Vairone](#)
- [Tinca](#)

COTTIDAE

- [Scazzone](#)

GOBIDI

- [Ghiozzo di ruscello](#)

COBITIDAE

- [Cobite](#)

ICTALURIDAE

- [Pesce gatto](#)

SILURIDAE

- [Siluro](#)

POECILIDAE

- [Gambusia](#)

ESOCIDAE

- [Luccio](#)

ATHERINIDAE

MORFOLOGIA

corpo slanciato ed affusolato; colorazione verdastra sul dorso, fianchi argentei, ventre bianco; bocca grande e terminale

TAGLIA

raramente fino a 60 cm (4 kg)

DISTRIBUZIONE

in Italia colonizza le acque del Nord, del Centro e del Sud fino al F. Crati (Calabria). Nell'Italia centrale è presente una specie assai simile e finora confusa con esso: il Cavedano etrusco (*Leuciscus lucumonis* Bianco, 1982)

COMPORAMENTO

i giovani formano piccoli gruppi, gli adulti hanno abitudini più solitarie

HABITAT

frequenta ambienti diversi. Nei fiumi caratterizza la ZONA A BARBO, ma è frequente anche nella ZONA A CIPRINIDI. Nei laghi di grandi e medie dimensioni frequenta le zone litorali. Abbastanza resistente all'inquinamento

ALIMENTAZIONE

onnivoro; i grossi individui sono prevalentemente ittiofagi

RIPRODUZIONE

da aprile a giugno; la schiusa avviene dopo una settimana. L'accrescimento è moderatamente rapido e le femmine raggiungono la maturità sessuale a 3 anni; maschi con tubercoli nuziali

- [Latterino](#)

CENTRARCHIDAE

- [Persico sole](#)
- [Persico trota](#)

PERCIDAE

- [Persico reale](#)
- [Lucioperca](#)

MUGILIDAE

- [Cefalo](#)

ANGUILLIDE

- [Anguilla](#)