



Coregonus sp. (forma hybrida)

FAMIGLIA: Salmonidae

ORDINE: Salmoniformes

MORFOLOGIA

corpo affusolato e leggermente compresso lateralmente; seconda pinna dorsale adiposa; bocca piccola e terminale; dorso grigio-azzurro, fianchi argentei e ventre bianco

TAGLIA

max 60 cm; 4kg; accrescimento condizionato dalla disponibilità di cibo e da fenomeni di competizione; nanismo in condizioni ambientali sfavorevoli

DISTRIBUZIONE

grandi laghi subalpini, grandi laghi vulcanici laziali, laghi appenninici dell'Italia centrale. In Umbria presente nel Lago di Piediluco

HABITAT

luoghi profondi caratterizzati da acque limpide e ben ossigenate

COMPORTEMENTO

abitudini gregarie; vive a vari metri di profondità nelle zone aperte dei laghi e si avvicina a riva solo per la riproduzione

ALIMENTAZIONE

planctofago, piccoli crostacei, molluschi e larve d'insetti

RIPRODUZIONE

la deposizione avviene in autunno-inverno in acque basse e preferibilmente nel tratto inferiore dei fiumi immissari; tubercoli nuziali su tutto il corpo, più sviluppati nei maschi; maturità sessuale precoce (primo anno d'età)

FAMIGLIE e Specie

SALMONIDAE

- [Trota fario](#)
- [Trota iridea](#)
- [Coregone](#)

CYPRINIDAE

- [Cavedano](#)
- [Barbo comune](#)
- [Lasca](#)
- [Alborella](#)
- [Carassio](#)
- [Carassio dorato](#)
- [Carpa erbivora](#)
- [Carpa](#)
- [Carpa a specchi](#)
- [Trioitto](#)
- [Savetta](#)
- [Scardola](#)
- [Rovella](#)
- [Vairone](#)
- [Tinca](#)

COTTIDAE

- [Scazzone](#)

GOBIDI

- [Ghiozzo di ruscello](#)

COBITIDAE

- [Cobite](#)

ICTALURIDAE

- [Pesce gatto](#)

SILURIDAE

- [Siluro](#)

POECILIDAE

- [Gambusia](#)

ESOCIDAE

- [Luccio](#)

ATHERINIDAE

- [Latterino](#)

CENTRARCHIDAE

- [Persico sole](#)
- [Persico trota](#)

PERCIDAE

- [Persico reale](#)
- [Lucioperca](#)

MUGILIDAE

- [Cefalo](#)

ANGUILLIDE

- [Anguilla](#)