



*Scardinus erythrophthalmus*

(Linnaeus, 1758)

*FAMIGLIA:* Cyprinidae

*ORDINE:* Cypriniformes

**MORFOLOGIA**

corpo ovale, compresso lateralmente; bocca obliqua; dorso scuro, fianchi e ventre argentei, pinne ventrali e anale di colore bruno rossastro

**TAGLIA**

può superare il chilogrammo di peso ed una lunghezza di 30-40 cm

**DISTRIBUZIONE**

indigeno; ampiamente diffuso nelle regioni settentrionali e peninsulari, assente nelle isole e nell'estremo meridione. Umbria: tutti i laghi, tratto inferiore dei principali corsi d'acqua

**HABITAT**

laghi ed ambienti stagnanti, tratto di pianura dei fiumi (ZONA A CIPRINIDI) con abbondanza di vegetazione acquatica e fondo melmoso; poco sensibile a fenomeni d'inquinamento organico

**COMPORAMENTO**

specie gregaria; staziona fra la vegetazione acquatica in prossimità della superficie

**ALIMENTAZIONE**

onnivora; vegetali, invertebrati ed in inverno anche piccoli pesci

**RIPRODUZIONE**

aprile-luglio; uova deposte sulla vegetazione; maschi con tubercoli nuziali sul capo; maturità sessuale raggiunta nelle femmine a tre anni d'età

FAMIGLIE e Specie

SALMONIDAE

- [Trota fario](#)
- [Trota iridea](#)
- [Coregone](#)

CYPRINIDAE

- [Cavedano](#)
- [Barbo comune](#)
- [Lasca](#)
- [Alborella](#)
- [Carassio](#)
- [Carassio dorato](#)
- [Carpa erbivora](#)
- [Carpa](#)
- [Carpa a specchi](#)
- [Triotto](#)
- [Savetta](#)
- [Scardola](#)
- [Rovella](#)
- [Vairone](#)
- [Tinca](#)

COBITIDAE

- [Scazzone](#)
- [Ghiozzo di ruscello](#)
- [Cobite](#)

ICTALURIDAE

- [Pesce gatto](#)

SILURIDAE

- [Siluro](#)

POECILIDAE

- [Gambusia](#)

ESOCIDAE

- [Luccio](#)

ATHERINIDAE

- [Latterino](#)

CENTRARCHIDAE

- [Persico sole](#)
- [Persico trota](#)

PERCIDAE

- [Persico reale](#)
- [Lucioperca](#)

MUGILIDAE

- [Cefalo](#)

ANGUILLIDE

- [Anguilla](#)