

*Tinca tinca*

(Linnaeus, 1758)

**FAMIGLIA:** *Cyprinidae***ORDINE:** *Cypriniformes***MORFOLOGIA**

corpo tozzo ricoperto da abbondante muco e scaglie piccole; bocca terminale carnosa, munita di due barbigli; verde-bruno sul dorso, verde-giallo sui fianchi, giallo sul ventre; maschi con pinne ventrali di dimensioni maggiori

**TAGLIA**

40-50 cm e 1,5-2 kg

**DISTRIBUZIONE**

indigena in tutta l'Italia continentale, introdotta in Sicilia e Sardegna; Umbria: tutti i laghi, tratto medio ed inferiore del F.Tevere e tratto terminale dei suoi principali affluenti

**HABITAT**

acque stagnanti o a corrente molto lenta (ZONA A CIPRINIDI), ricche di vegetazione e con fondo melmoso

**COMPORAMENTO**

più attiva di notte; sverna affondata nel fango in condizioni di semiletargo

**ALIMENTAZIONE**

onnivora: organismi di fondo (anellidi, insetti e molluschi) e vegetali

**RIPRODUZIONE**

maggio-luglio; deposizione fitofila in acque basse e a più riprese; le larve, dotate di organi adesivi, rimangono attaccate alla vegetazione fino al riassorbimento del sacco vitellino; crescita lenta; maturità sessuale raggiunta tra il 2° ed il 4° anno

**FAMIGLIE e Specie****SALMONIDAE**

- [Trota fario](#)
- [Trota iridea](#)
- [Coregone](#)

**CYPRINIDAE**

- [Cavedano](#)
- [Barbo comune](#)
- [Lasca](#)
- [Alborella](#)
- [Carassio](#)
- [Carassio dorato](#)
- [Carpa erbivora](#)
- [Carpa](#)
- [Carpa a specchi](#)
- [Triotto](#)
- [Savetta](#)
- [Scardola](#)
- [Rovella](#)
- [Vairone](#)
- [Tinca](#)

**COTTIDAE**

- [Scazzone](#)

**GOBIDI**

- [Ghiozzo di ruscello](#)

**COBITIDAE**

- [Cobite](#)

**ICTALURIDAE**

- [Pesce gatto](#)

**SILURIDAE**

- [Siluro](#)

**POECILIDAE**

- [Gambusia](#)

**ESOCIDAE**

- [Luccio](#)

**ATHERINIDAE**

- [Latterino](#)

CENTRARCHIDAE

- [Persico sole](#)
- [Persico trota](#)

PERCIDAE

- [Persico reale](#)
- [Lucioperca](#)

MUGILIDAE

- [Cefalo](#)

ANGUILLIDE

- [Anguilla](#)