



*Salmo (trutta) trutta*

(Linnaeus, 1758)

*FAMIGLIA: Salmonidae*

*ORDINE: Salmoniformes*

FAMIGLIE e Specie

SALMONIDAE

- [Trota fario](#)
- [Trota iridea](#)
- [Coregone](#)

CYPRINIDAE

- [Cavedano](#)
- [Barbo comune](#)
- [Lasca](#)
- [Alborella](#)
- [Carassio](#)
- [Carassio dorato](#)
- [Carpa erbivora](#)
- [Carpa](#)
- [Carpa a specchi](#)
- [Triotto](#)
- [Savetta](#)
- [Scardola](#)
- [Rovella](#)
- [Vairone](#)
- [Tinca](#)

MORFOLOGIA

corpo allungato e leggermente compresso lateralmente; testa robusta e bocca terminale grande, munita di forti denti; colorazione variabile in relazione all'ambiente: dorso da bruno scuro a quasi argenteo, tipica la presenza di piccole macchie nere, rosse e marrone o di alta sfumatura sui fianchi e sulla testa; seconda pinna dorsale adiposa

TAGLIA

lunghezza massima di 50 cm e 1,5 kg di peso

HABITAT

acque a corrente molto rapida, fresche e ben ossigenate con fondale roccioso, sassoso o ghiaioso (ZONA A SALMONIDI)

DISTRIBUZIONE

presente in tutte le acque dolci italiane, indigena probabilmente solo nell'arco alpino e nel versante settentrionale dell'Appennino. Umbria: ampiamente diffusa nei tratti montani dei corsi d'acqua, soprattutto nel bacino del F.Nera

COMPORAMENTO

solitario con abitudini territoriali

ALIMENTAZIONE

invertebrati acquatici e terrestri (soprattutto insetti), pesci; fenomeni di cannibalismo

RIPRODUZIONE

ottobre-febbraio; risalgono i corsi d'acqua alla ricerca di aree di frega idonee; uova deposte in buche scavate dalle femmine; maturità sessuale raggiunta a 3-4 anni nelle femmine

COTTIDAE

- [Scazzone](#)

GOBIDI

- [Ghiozzo di ruscello](#)

COBITIDAE

- [Cobite](#)

ICTALURIDAE

- [Pesce gatto](#)

SILURIDAE

- [Siluro](#)

POECILIDAE

- [Gambusia](#)

ESOCIDAE

- [Luccio](#)

ATHERINIDAE

- [Latterino](#)

CENTRARCHIDAE

- [Persico sole](#)
- [Persico trota](#)

PERCIDAE

- [Persico reale](#)
- [Lucioperca](#)

MUGILIDAE

- [Cefalo](#)

ANGUILLIDE

- [Anguilla](#)